

# Zwei neue Lamiinen aus West-Afrika.

Dr. K. Jordan, Tring, England.

## *Sternotomis coronata* sp. nov.

♂♀. Supra pube laete fuliginoso-ochracea vestita, nigro-  
et viridi-signata. Mandibulae basi viridescenti-pubescentes,  
(♂) inermes, extus triangulariter impressae. Caput ante pro-  
thoracem metallico-viride, lateribus sparsissime punctatum;  
occipite duabus maculis triangularibus nigris et genis lineola  
obliqua atra signatis.

Antennae (♂) longitudine corporis, (♀) breviores, nigrae,  
versus apicem luteo-tomentosae, scapo infra viridi-metallico-  
pubescente. Prothorax pone apicem sulco bene determinato,  
dorso in medio parum versus posticum dilatato instructus,  
basi late constrictus, parte constricta antice sulco determinata  
lateribus haud dorso sulco altero notata, disco paulo inaequalis;  
macula parva triangulari in medio sulci apicali, duabus lineis  
ab hac macula oblique versus basin abeuntibus, linea trans-  
versa in margine postico disci elevati sita medio antrorum  
dilatata vel flexuosa hic et inde virescenti nigris ac margine  
extremo basali; dente lateralili et basi laterum et medio prosterni  
viridi-pubescentibus.

Scutellum latum, rotundatum, metallio-virens. Elytra  
dorso ad humeralem callum nonnullis punctis sat profundis  
notata, lateribus partim punctulata; signaturis nigris notata;  
callo humerali nigro viridi-pubescente, triangulo transverso  
communi basali in utroque elytro maculam obliquam fuliginoso-  
et viridi-tomentosam includente, macula communi antemediana  
in sutura lat. 1 mm utrinque duas lineas emitte, prima  
linea antrorum in medium disci ascendentem, deinde in angulo  
acuto retrorum ad marginem lateralem flexa, secunda medium  
disci vix attingente, pone lineam primam in medio disci  
macula vel puncto nigro viridi-cineto; macula altera mediana  
communi etiam duas lineas emitte, his lineis maculam plus  
minusve viridem medio nigram postmedianam discoidalem  
oblique transversam eingentibus et postice intra suturam et  
medium disci confluentibus oblique versus suturam abeuntibus  
ramum brevem in discum emittebibus et in sutura ad apicem  
usque descendenteribus; sutura intra maculas medianam et ante-  
medianam nigra; macula lateralili anteapicali viridi nigro-cincta,  
puncto lateralili posthumerali nigro.

Corpus infra eum pedibus metasterno ochraceo excepto viride; segmentis abdominis macula transversa basali in ♂ late sinuata subglabra punetata, in ♀ linearis signatis; pedum pilis flavis.

Long. 21 mm, elytr. 15, lat. 8.

Hab. Kriby, Kamerun (Pahl leg.; Typus in Mus. Stuttgart).

Die Zeichnung des Halschildes ist eigenartig durch die zwei schief stehenden schwarzen Längslinien. Die Deeken haben nur in der Gegend der Naht entwickelte Querbinden: hinter der Mitte neben der Naht trägt jede Decke einen ovalen oekergelben Fleck, der durch die in obiger Beschreibung angegebenen schwarzen Linien isolirt wird.

Die grüne Pubescenz des Hinterleibes und der Beine ist nach dem Licht etwas veränderlich, sie erscheint zuweilen mehr grau, zuweilen mehr bläulich.

Die Basis des Halschildes trägt dorsal nur eine Querfurche, unmittelbar hinter der steil abfallenden Scheibe.

### Glenea imparilis sp. nov.

♂♀. A speciebus *G. carneipes* Chevr., *proxima* Lam., *vittata* Lam. dietis elytrorum signatura diversa: singulo elytro ♂ maculis albis signato, 1<sup>a</sup> dorsali basali in medio intra carinam dorso-lateralem et suturam sita paulo trans elytri quartam partem basalem abeunte, 2<sup>a</sup> minuta dorso-lateralis posthumerali intra carinam dorso-lateralem et elevationem cariniformem dorsalem, 3<sup>a</sup> mediana etiam dorso-lateralis latitudine plus duplo longiore, 4<sup>a</sup> postmediana intra striam lam et carinam dorsalem latitudine longiore, 5<sup>a</sup> anteapicali subrotunda intra striam lam et carinam dorso-lateralem; margine apicali anguste albo-pubescente.

Hab. Begora und Akim, W.-Afrika (Typus in Mus. Stuttgart).

♂ Der Körper ist braun, der Hinterleib etwas heller; die Beine haben eine blaßröhliche Farbe. Von den 5 Binden des Halschildes (3 dorsal, jederseits 1 oberhalb der Hüften) ist die mittlere die dünnste. Der erste Fleck der Deeken ist vorn und hinten versehnäler, und erreicht den Basalrand der Decke nicht. Strukturelle Unterschiede zwischen dieser neuen Art und den verwandten Formen sind kaum vorhanden. Die Punktirung der Stirn und der Flügeldecken ist stark, der Suturalzahn der Deckenspitze ist kurz, und die mit 2 Reihen tiefer Punkte versehenen senkrecht abfallenden Seiten der Deeken sind nach hinten gekielt.